

# 02



## UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

**PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA  
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E  
RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER  
EDITAL 1/2014**

**- RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA -  
- ENFERMAGEM -**

<b>DIA</b> <b>23/02/2014</b>	<b>HORÁRIO</b> <b>14h</b>	<b>CADERNO</b> <b>02</b>
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

### Ficha de Identificação

NOME:		
NÚCLEO:		Nº INSCRIÇÃO:
Nº DO PRÉDIO:	SALA:	ASSINATURA



**COMISSÃO TÉCNICA DE CONCURSOS**

## ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - Este caderno contém 60 questões do tipo múltipla escolha.
- 02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
- 03 - Cada questão tem quatro (4) opções (A - B - C - D). Apenas uma (1) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma questão sem resposta. Se isso acontecer, a mesma será anulada.
- 04 - Para marcar as respostas, use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. **NÃO** utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha ●
- 05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
- 06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. **NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.**
- 07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
- 08 - Preencha corretamente a Ficha de Identificação colocada na capa.
- 09 - UMA HORA após o início das provas, você poderá retirar-se da sala, **SEM LEVAR ESTE CADERNO.**

### DURAÇÃO DESTAS PROVAS: QUATRO HORAS

OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das provas. É proibido o uso de boné.

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**  
**Questões numeradas de 01 a 60**

**QUESTÃO 01**

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Dentre as alternativas abaixo, qual apresenta a relação das prioridades pactuadas?

- A) Saúde do Trabalhador; Saúde do Adolescente; promoção da Saúde na Escola; Saúde do Homem; fortalecimento da Atenção Básica.
- B) Saúde do trabalhador; Saúde do Homem, redução da Mortalidade Infantil e Materna; promoção da Saúde na Escola; fortalecimento da Atenção Básica.
- C) Saúde do Idoso; Saúde do Homem; promoção da Saúde na Escola; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, fortalecimento da Atenção Básica.
- D) Saúde do Idoso; controle do Câncer do Colo do útero e mama; redução da Mortalidade Infantil e Materna; promoção da saúde, fortalecimento da Atenção Básica; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas.

---

**QUESTÃO 02**

Considerando os objetivos do fortalecimento da Atenção Básica propostos no Pacto pela Vida, marque (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as sentenças falsas:

- I - Consolidar e qualificar a Estratégia de Saúde da Família nos pequenos e médios municípios.
- II - Ampliar e qualificar a Estratégia de Saúde da Família nos grandes centros urbanos.
- III - Garantir o financiamento da Atenção Básica como responsabilidade exclusiva da esfera nacional de gestão do SUS.
- IV - Assumir a Estratégia de Saúde da Família como estratégia prioritária para o fortalecimento da Atenção Básica, devendo seu desenvolvimento considerar as diferenças loco-regionais.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- A) Somente a sentença III é falsa.
- B) Somente a sentença IV é verdadeira.
- C) As sentenças I e IV são falsas.
- D) Todas as sentenças são verdadeiras.

---

**QUESTÃO 03**

As alternativas abaixo apresentam os blocos de financiamento para o custeio do Sistema Único de Saúde estabelecidos pelo Pacto de Gestão, **EXCETO**:

- A) Atenção básica; Atenção Média e Alta Complexidade.
- B) Vigilância em Saúde; Assistência Farmacêutica;
- C) Assistência Odontológica.
- D) Gestão do SUS.

---

**QUESTÃO 04**

Segundo Starfield (2004), ao avaliar os aspectos da Atenção Primária que são fundamentais, mas **não exclusivos** a ela, cinco áreas merecem atenção, a saber:

- A) Centralização na família, competência cultural, orientação comunitária, adequação dos prontuários médicos e proteção aos pacientes.
- B) Centralização na família, competência cultural, orientação comunitária, coordenação da atenção e primeiro contato.
- C) Adequação dos prontuários médicos, continuidade do pessoal, comunicação profissional-paciente, a qualidade da atenção e proteção aos pacientes.
- D) Adequação dos prontuários médicos, continuidade do pessoal, longitudinalidade, centralização na família e orientação comunitária.

---

**QUESTÃO 05**

A Cidade Saudável faz parte dos projetos estruturantes da produção social da saúde e deve apresentar as características abaixo, **EXCETO**:

- A) Trabalho Setorial.
  - B) Busca da melhoria da qualidade de vida.
  - C) Compromisso com a equidade.
  - D) Construção cotidiana da cidadania.
- 

**QUESTÃO 06**

O espaço local – Território – é o cenário estabelecido por atores sociais no desenrolar de um processo em que problemas de saúde se confrontam com os serviços prestados e onde as necessidades cobram ações. Em relação a esses espaços, marque a 1º coluna de acordo com a 2º.

- |                         |                          |  |
|-------------------------|--------------------------|--|
| I – Distrito Sanitário  | <input type="checkbox"/> | Corresponde à área de responsabilidade de uma Unidade de Saúde.  |
| II- Área de Abrangência | <input type="checkbox"/> | Esse espaço tem perfil epidemiológico específico, através da caracterização desse perfil é que são definidas as ações de saúde específicas para essa área. |
| III- Microárea de Risco | <input type="checkbox"/> | O detalhamento dessa base territorial é que possibilita a adscrição de clientela, além de favorecer ações de controle de saúde, visando às prioridades.    |
| IV- Domicílio           | <input type="checkbox"/> | A definição desse espaço territorial depende de critérios de natureza político - administrativa.   |

Marque abaixo a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) I, IV, III, II.
  - B) I, IV, II, III.
  - C) II, IV, III, I
  - D) II, III, IV, I.
- 

**QUESTÃO 07**

O termo “Diabetes Mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999). A introdução de um novo tratamento para essa doença, que não cure, mas que aumente a sobrevivência desses pacientes acarretará em:

- A) Redução da prevalência
  - B) Aumento da prevalência
  - C) Aumento da incidência.
  - D) Redução da incidência.
- 

**QUESTÃO 08**

O Modelo Calgary de Avaliação de Famílias (MCAF) é uma estrutura multidimensional que contempla três categorias principais de funcionamento da família: estrutural, de desenvolvimento e funcional. Pode ser usado no processo de cuidar em Enfermagem no contexto da Saúde da Família possibilitando alterar os padrões usuais da prática e propiciando avaliar e intervir com as famílias. Sobre o MCAF marque a alternativa **INCORRETA**:

- A) Os processos de “Feedback” podem ocorrer simultaneamente nos vários níveis de sistemas com as famílias.
  - B) A família é capaz de gerar um equilíbrio entre mudança e estabilidade.
  - C) Os comportamentos dos membros da família são mais bem compreendidos sob o ponto de vista de uma causalidade linear e não circular.
  - D) Os sistemas familiares têm capacidade autorreguladora.
-

---

**QUESTÃO 09**

Considerando as atribuições comuns a todos os profissionais de Saúde da Família estabelecidas na Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, analise as assertivas abaixo:

- I - participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe;
- II - manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde;
- III - realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros);
- IV - realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local;
- V - garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e garantir o atendimento da demanda espontânea, e a realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde;

Assinale a alternativa que aponta as assertivas **CORRETAS**.

- A) Apenas I, II, III e V.
- B) Apenas II, III, IV e V.
- C) Apenas I, III, IV e V.
- D) Todas estão corretas.

---

**QUESTÃO 10**

Segundo a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008 os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) tem como objetivo ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica. Com base nessa definição, avalie as afirmativas abaixo e marque (V) para as alternativas corretas e (F) para as falsas:

- Os NASF fazem parte da atenção básica, mas não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
- Os NASF podem ser organizados em duas modalidades, NASF 1 e NASF 2. A implantação de mais de uma modalidade de forma concomitante nos municípios e no Distrito Federal receberá incentivo financeiro federal.
- Quando presente no NASF, o profissional sanitário pode reforçar as ações de apoio institucional e/ou matricial, ainda que não sejam exclusivas dele.
- Compete às Secretarias de Saúde dos municípios e do Distrito Federal fazer a territorialização de cada NASF de acordo com o número de Policlínica e Unidades de Pronto atendimento (UPA) a ele vinculados.

A alternativa que indica sequência **CORRETA** é:

- A) F, F, V, V
- B) V, V, F, F
- C) V, F, V, F
- D) F, V, V, V

---

**QUESTÃO 11**

No Município de Padre Chico existe um Conselho Local de Saúde vinculado a Unidade de Saúde da Família Vila Aurora. A composição deste conselho segue a regulamentação Nacional dos Conselhos de Saúde, tendo 2 membros representantes dos profissionais de Saúde, 2 representantes do governo e nenhum representante de prestadores privados (por inexistência). Assim, o número de representantes da população nesse Conselho de Saúde deverá ser:

- A) 01 membro.
- B) 03 membros.
- C) 02 membros.
- D) 04 membros.

---

**QUESTÃO 12**

A Lei 8080 de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Conforme seu capítulo II, são princípios do SUS, **EXCETO**:

- A) descentralização político-administrativa;
- B) Universalidade do acesso e Equidade;
- C) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
- D) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde

---

**QUESTÃO 13**

Quanto ao exame físico completo que deve ser realizado na primeira consulta de puericultura de um recém nascido, analise as afirmativas abaixo:

- I - Consideram-se normais tanto uma perda de peso de até 10% ao nascer quanto a sua recuperação até o 15º dia de vida.
- II - A temperatura axilar normal situa-se entre 36,4°C e 37,5°C e não necessita ser medida rotineiramente em crianças assintomáticas exceto na presença de fatores de risco, como febre materna durante o parto.
- III - A fontanela anterior mede de 1cm a 4cm, tem forma losangular, fecha-se do 9º ao 18º mês e não deve estar fechada no momento do nascimento. A fontanela posterior é triangular, mede cerca de 0,5cm e fecha-se até o segundo mês.
- IV - A frequência cardíaca do RN normalmente varia entre 120bpm e 160bpm.

Marque a opção **CORRETA**.

- A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
- B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- C) Apenas a afirmativa I, II e III estão corretas
- D) Todas as afirmativas estão corretas

---

**QUESTÃO 14**

Assinale a opção na qual a associação entre idade, vacina, dose e doenças evitadas **NÃO** foi feita corretamente:

	<b>Idade</b>	<b>Vacina</b>	<b>Dose</b>	<b>Doenças evitadas</b>
A)	2 meses	Hepatite	2ª dose	Hepatite B
B)	6 meses	Vacina pneumocócica 10 (conjugada)	3ª dose	Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo <i>Pneumococo</i>
C)	9 meses	Febre Amarela	Dose inicial	Febre amarela
D)	12 meses	Tríplice Viral	1ª dose	Sarampo, caxumba e rubéola

---

**QUESTÃO 15**

Uma criança que recebeu a primeira dose da vacina Tríplice Viral apresentou febre de 38°C, sem nenhum outro sintoma associado três dias após a vacinação. Ao comparecer à unidade de saúde, o enfermeiro tratou o caso como reação adversa da vacinação. A conduta do profissional foi:

- A) **CORRETA**, pois nos casos de vacinas vivas pode ocorrer elevação de temperatura associada a vacinação até vários dias após a mesma.
- B) **ERRADA**, por se tratar de vacina viva, a febre só pode ser considerada reação adversa da vacinação se aparecer nas primeiras horas após a mesma.
- C) **CORRETA**, por se tratar de vacina não viva, a elevação de temperatura está sempre associada à vacinação.
- D) **ERRADA**, só se pode considerar reação adversa da vacinação os casos de elevação de temperatura acima de 39°C.

---

**QUESTÃO 16**

A promoção da amamentação na gestação, comprovadamente, tem impacto positivo nas prevalências de aleitamento materno, em especial entre as primíparas. Durante o acompanhamento pré-natal, quer seja em grupo, quer seja no atendimento individual, é importante o diálogo com as mulheres. Todos os aspectos abaixo devem ser abordados na promoção do aleitamento materno, **EXCETO**:

- A) Manobras para aumentar e fortalecer os mamilos durante a gravidez, como esticar os mamilos com os dedos ou esfregá-los com buchas ou toalhas ásperas.
- B) Importância da amamentação logo após o parto, do alojamento conjunto e da técnica (posicionamento e pega) adequada na prevenção de complicações relacionadas à lactação;
- C) O uso de sutiã adequado ajuda na sustentação das mamas, pois na gestação elas apresentam o primeiro aumento de volume.
- D) Planos da gestante com relação à alimentação da criança, assim como experiências prévias, mitos, suas crenças, medos, preocupações e fantasias relacionados com o aleitamento materno;

---

**QUESTÃO 17**

Considere as duas afirmações abaixo.

- 1 – No manejo do ingurgitamento mamário, recomenda-se o uso de compressas frias (ou gelo envolto em tecido), em intervalos regulares após ou nos intervalos das mamadas.
- 2 – As compressas frias provocam vasoconstrição temporária pela hipotermia, o que leva à redução do fluxo sanguíneo, com conseqüente redução do edema, aumento da drenagem linfática e menor produção do leite, devida à redução da oferta de substratos necessários à produção do leite.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
- B) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
- C) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- D) as duas afirmações são falsas.

---

**QUESTÃO 18**

Analisar as afirmativas abaixo assinalando (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- ( ) Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a frequência respiratória normal para uma criança de 0 a 2 meses de vida é de até 60/m.
- ( ) A criptorquidia isolada é a anomalia congênita mais comum ao nascimento.
- ( ) O umbigo hiperemiado e/ou com secreção purulenta não indica a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência.
- ( ) A hérnia umbilical tem indicação cirúrgica imediata, devido ao risco de encarceramento ou estrangulamento.
- ( ) Mãe com menos de 18 anos de idade e/ou baixa escolaridade (menos de oito anos de estudo) indica situação de risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido.

Marque a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) V, V, F, F, F.
- B) V, V, F, F, V.
- C) F, F, F, V, V.
- D) V, F, V, V, V.

---

**QUESTÃO 19**

No acompanhamento e avaliação do desenvolvimento infantil a atenção primária tem como objetivo a promoção, proteção e detecção precoce de alterações passíveis de modificação que possam repercutir em sua vida futura. Analise as afirmativas abaixo e marque a opção **INCORRETA**:

- A) Entre 2 e 4 meses de vida o bebê fica de bruços, levanta a cabeça e os ombros.
- B) O reflexo de Moro é incompleto até o 6º mês de vida e não deve existir a partir do 9º mês.
- C) Em torno de 1 ano de vida o bebê possui a acuidade visual de um adulto.
- D) Entre 3 e 4 anos a criança veste-se com auxílio.

---

**QUESTÃO 20**

Todas abaixo são recomendações do Ministério da Saúde para a abordagem de pacientes adolescentes portadores de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), **EXCETO**:

- A) Convocação, tratamento e orientação dos parceiros sexuais.
- B) Orientação para a realização do teste anti-HIV (conforme orientações do manual da Coordenadoria de DST/Aids).
- C) Comunicação aos pais ou responsáveis para que se garanta a adesão ao tratamento.
- D) Exame clínico-genital minucioso, que contemple a busca de outras DST.

---

**QUESTÃO 21**

Identificar situações que se configuram como de ALTO RISCO para os adolescentes, a fim de priorizá-las no atendimento, é uma das atribuições dos profissionais que atuam nas equipes da Atenção Primária à Saúde. Todas as situações abaixo configuram ALTO RISCO à saúde do adolescente, **EXCETO**:

- A) Adolescentes que estejam fazendo uso/abuso de substâncias lícitas ou ilícitas (com destaque ao uso do tabaco e do álcool).
- B) Adolescentes com transtornos alimentares: bulimia e anorexia.
- C) Adolescentes que fogem com frequência de casa ou se encontram morando nas ruas.
- D) Adolescentes que tenham iniciado a atividade sexual precocemente.

---

**QUESTÃO 22**

O termo puberdade é utilizado para designar especificamente as transformações corporais decorrentes da ação dos hormônios do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. O seu início acontece entre os 08 e os 13 anos para o sexo feminino e entre 09 e 14 anos, para o sexo masculino. Os principais eventos observados nesta fase são:

- A) O estirão puberal, o surgimento dos caracteres sexuais secundários e a conseqüente iniciação sexual.
- B) O surgimento dos caracteres sexuais secundários, a poluição noturna e a ginecomastia puberal.
- C) O estirão puberal, as alterações na quantidade e na distribuição de gordura no corpo e o desenvolvimento do sistema respiratório, circulatório e das gônadas;
- D) A aceleração e desaceleração do crescimento, a ginecomastia puberal e a menarca/espermarca.

---

**QUESTÃO 23**

Considere as duas afirmações abaixo.

- 1 – A contracepção de emergência, como o próprio nome sugere, deve ser usada de forma esporádica e não como a opção anticoncepcional de eleição (situação que deve ser evitada na adolescência).
- 2 – A pílula do Dia Seguinte atua impedindo a ovulação e a implantação do óvulo fecundado, não interfere com a gravidez em evolução e tem sua eficácia diminuída à medida que é maior o intervalo de tempo entre a relação desprotegida e sua utilização.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
- B) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- C) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
- D) a primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira.

---

**QUESTÃO 24**

Sobre a gravidez na adolescência, todas as afirmativas abaixo são corretas, **EXCETO**:

- A) O casamento e a maternidade, especialmente em estratos sociais baixos, têm sido utilizados por algumas adolescentes como forma de adquirir projeção social e mudança do lugar que ocupam na família, passando a ter um status de maioridade.
- B) Dentre as conseqüências orgânicas da gravidez precoce para a mãe, estão: anemia, menor ganho de peso e hipertensão gestacional.
- C) A diminuição da idade da menarca e a presença de um desejo, consciente ou não, de engravidar, estão entre as causas da gravidez indesejada na adolescência
- D) As pesquisas têm apontado que a ocorrência de aborto tem sido mais freqüente entre os estratos sociais baixos, diferentemente dos estratos sociais médios e altos nos quais a gestação tende a ser concluída.

---

**QUESTÃO 25**

O texto se refere a uma DST que tem como agente etiológico um protozoário transmitido frequentemente pelo contato sexual, podendo ser encontrado na uretra, bexiga, ureteres, canal cervical, cavidade uterina e glândulas vulvares. O parasita desenvolve-se melhor em condições de anaerobiose e com pH maior que 5. O quadro clínico varia de ausência de sintomas a leucorréia pós-menstrual esverdeada ou acinzentada, com dispareunia, dor hipogástrica. Ao exame observa-se secreção vaginal fluída, bolhosa, intensa hiperemia de vagina e cérvix uterina, visualização do parasita à microscopia a fresco (pela sua mobilidade). A secreção pode ser abundante e de pH alcalina (acima de 5). A cérvix pode ter "aspecto de morango", correspondendo à acentuada distensão dos vasos sanguíneos superficiais e a focos de hemorragia. O texto faz referencia a qual doença?

- A) vaginose bacteriana causada pela *Gardnerella vaginalis*.
- B) gonorréia causada pela *Neisseria gonorrhoeae*.
- C) tricomoníase causada pelo *Trichomonas vaginalis*.
- D) condiloma acuminado causado pelo HPV.

---

**QUESTÃO 26**

Correlacione alguns dos métodos de anticoncepção com seus respectivos mecanismos de ação.

**Métodos de anticoncepção**

- (I) Diafragma.
- (II) Laqueadura.
- (III) Dispositivo intrauterino
- (IV) Vasectomia.
- (V) Contraceptivo hormonal

**Mecanismos de ação**

- ( ) impede a liberação dos gametas da gônada para a uretra.
- ( ) impede a nidação no endométrio.
- ( ) impede que os gametas cheguem ao terço distal das tubas.
- ( ) impede a ovulação
- ( ) impede a passagem dos gametas da vagina para o útero.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) I, II, III, V, IV.
- B) IV, III, II, V, I.
- C) V, II, III, I, IV.
- D) III, II, IV, V, I.

---

**QUESTÃO 27**

Em relação à assistência ao planejamento familiar, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo .

- ( ) A escolha do método anticoncepcional para planejamento familiar deve ser realizado considerando as características do método, assim como fatores individuais e situacionais relacionados ao usuário do método.
- ( ) A inocuidade é uma característica pertinente ao método contraceptivo escolhido e refere-se a eficácia prática do método.
- ( ) Para os casais estáveis com dois filhos ou mais os métodos irreversíveis como vasectomia e laqueadura são os mais recomendados.
- ( ) O método Ogino-Knaus é um método natural de planejamento familiar e não é indicado para mulheres com ciclos menstruais irregulares.
- ( ) Após o parto ou aborto é recomendado que se espere 45 dias para a inserção do dispositivo intra uterino (DIU).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) V – V – V – F- V.
- B) F – V – V – F- V.
- C) V – F – V – V- F.
- D) V – F – F – V - F.

---

**QUESTÃO 28**

JFT, 26 anos, vem a consulta de pré natal trazendo os resultados exames laboratoriais (abaixo) solicitados por você na primeira consulta de pré natal. Hoje ela encontra-se com 16 semanas de gestação, altura uterina de 14 cm e pressão arterial 110x65 mmHg

VDRL: positivo

HIV: negativo

Grupo sanguíneo: AB

Fator Rh: negativo

Glicemia de jejum: 92 mg/dl

Hemoglobina: 11,9 mg/dl Hematócrito: 35%

HbsAg: negativo

Urina rotina: traços de proteinúria

Urocultura negativa

Baseando-se na situação, marque a alternativa **CORRETA**.

- A) A gestante deve iniciar o tratamento para sífilis. Seu parceiro também deverá realizar o tratamento. Ela deverá realizar o exame de VDRL mensalmente.
- B) A gestante encontra-se com anemia leve. Ela devera iniciar o tratamento para anemia e repetir o exame de 30 a 60 dias após.
- C) Descarta-se a possibilidade de diabetes, porém a gestante deverá repetir o exame de glicemia de jejum no terceiro trimestre.
- D) A gestante deverá ser encaminhada ao pré-natal de alto risco devido a presença de traços de proteína na urina.

---

**QUESTÃO 29**

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a doença que mais frequentemente complica a gravidez, acometendo 5% a 10% das gestações, sendo uma das principais causas de morbimortalidade materna e perinatal (BRASIL, 2012).

Sobre as classificações da HAS na gestação marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipertensão crônica é o estado hipertensivo registrado antes do início da gestação no período que precede a 20ª semana de gravidez ou além de doze semanas após o parto.
- B) Pré-eclâmpsia superposta à HAS crônica é definida pela elevação aguda da PA, à qual se agregam proteinúria, trombocitopenia ou anormalidades da função hepática em gestantes portadoras de HAS crônica, com idade gestacional superior a 20 semanas.
- C) Hipertensão gestacional é o aumento da pressão arterial que ocorre após a 20ª semana de gestação, mais frequentemente perto do parto ou no puerpério imediato, com presença de proteinúria.
- D) Eclâmpsia corresponde à pré-eclâmpsia complicada por convulsões que não podem ser atribuídas a outras causas.

---

**QUESTÃO 30**

Dona Sebastiana, 55 anos, procura a UBS relatando que há 5 dias percebeu o aparecimento de um caroço na mama. Ao coletar o histórico de enfermagem e realizar o exame físico as seguintes informações são obtidas:

Ela nega doenças pregressas. A mãe faleceu aos 50 anos de causa desconhecida. Pai tem 76 anos, portador de hipertensão e câncer de estômago. A prima paterna teve câncer de mama, iniciado aos 59 anos e faleceu em decorrência do problema. Os filhos são hígidos. Na história ginecológica e obstétrica, ela relata que sua menarca foi aos 14 anos. DUM:20/11/13, sendo que vem apresentando irregularidade menstrual. G3P2A1, sendo a primeira gravidez aos 35 anos e a última aos 38 anos. Realizou laqueadura tubária. Ao exame foi palpado nódulo de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro, fixo, indolor a palpação, consistência fibro-elástica e bordas regulares na mama direita, no quadrante superior externo.

Baseando-se na situação problema analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa **CORRETA**.

- A) O fato da prima paterna ter tido câncer de mama aos 53 anos coloca dona Sebastiana no grupo com risco muito elevado para o desenvolvimento do câncer de mama.
- B) Alguns dos fatores de risco para o câncer de mama em Dona Sebastiana são a idade e a menstruação ainda presente.
- C) O fato de dona Sebastiana ter tido filhos após os 30 anos é considerado um fator de proteção para o câncer de mama.
- D) A presença da história pregressa de aborto aumenta o risco de dona Sebastiana ter câncer de mama.

---

**QUESTÃO 31**

Dona Francisca, 44 anos, recebeu o laudo de prevenção do câncer de colo de útero, apresentando o seguinte resultado: Atipias de significado indeterminado em células escamosas, provavelmente não neoplásica.

De acordo com o resultado apresentado, marque a resposta **INCORRETA**.

- A) O resultado representa uma atipia presente em células provenientes da ectocérvice.
- B) O resultado representa uma mistura de dificuldades diagnósticas, não sendo consideradas anormalidades e sim ambiguidades citopatológicas.
- C) A colposcopia é o método favorável como a primeira escolha na condução da paciente.
- D) O resultado é compatível com a antiga nomenclatura ASCUS, cujo uso, atualmente, é desaconselhado.

---

**QUESTÃO 32**

È muito importante que a equipe de atenção básica conheça e oriente a gestante sobre os aspectos legais e os direitos na gestação (BRASIL, 2012). Em relação a estes aspectos e direitos, analise as assertivas abaixo.

- I - A gestante tem direito ao conhecimento e à vinculação à maternidade, onde receberá a assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- II - A gestante tem direito à acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, porém não é permitido a permanência, do acompanhante, na maternidade.
- III - A licença-maternidade poderá ocorrer a partir do 7º mês da gestação. Neste caso, o atestado médico indicará a data do afastamento.
- IV - A mãe tem o direito a 2 (dois) descansos especiais, de meia hora cada um, durante a jornada de trabalho, para a amamentação de seu filho, até que complete 6 (seis) meses de idade.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- A) I e IV apenas.
- B) II, III e IV apenas.
- C) I, II e III apenas.
- D) I e III apenas.

---

**QUESTÃO 33**

Durante o terceiro trimestre, que medida pode ser usada para abordar os desconfortos da gestação?

- A) Redução de fibras dietéticas minimiza a flatulência que ocorre, muitas vezes, no final da gestação.
- B) A azia é amenizada com bebidas geladas – água ou suco.
- C) Exercícios com levantamento de peso fortalecem as costas e os músculos abdominais.
- D) Ingerir laxantes para tratar a constipação intestinal.

---

**QUESTÃO 34**

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) estão entre os problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo. Entre suas conseqüências estão a infertilidade feminina e masculina e a transmissão da mãe para o filho (BRASIL, 2005).

Com relação às DST, assinale **VERDADEIRO (V)** ou **FALSO (F)** nas afirmativas abaixo

- ( ) O Papilomavírus humano (HPV) pode causar verrugas genitais e recebe o nome de condiloma acuminado.
- ( ) O cancro mole é uma lesão erosada ou ulcerada, geralmente única, indolor, com bordas endurecidas, fundo liso, brilhante e secreção serosa escassa.
- ( ) A herpes é uma virose transmitida exclusivamente por via sexual, através do contato direto com as lesões contaminadas.
- ( ) Sífilis é uma DST que apresenta três fases distintas, e sua manifestação patológica, quando instalada, não é possível de cura.
- ( ) A hepatite B também pode ser considerada uma doença sexualmente transmissível.
- ( ) A tricomoníase vaginal pode alterar o resultado da citologia oncótica.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- A) V, V, V, F, V, F
- B) F, F, V, V, V, F
- C) V, F, V, F, V, V
- D) V, F, F, F, V, V

---

**QUESTÃO 35**

São fatores de risco que permitem a realização do Pré-natal pela equipe de atenção básica, **EXCETO**:

- A) RN de gestação anterior com restrição de crescimento, pré-termo ou malformado.
- B) História de macrossomia fetal em gestação anterior.
- C) Antecedente de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar.
- D) Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas em gestação anterior.

---

**QUESTÃO 36**

Gestante chega à unidade de saúde para a realização da primeira consulta de Pré-natal no dia 14/04/13, trazendo exame de  $\beta$ HCG positivo, relata não se lembrar da data exata da última menstruação, acredita que foi no final do mês de fevereiro de 2013. Calcule a data provável do parto (DPP) e a idade gestacional (IG) através da regra de Naegele e marque a opção **CORRETA**:

- A) DPP 07/12/13 – IG 7 semanas e 2 dias
- B) DPP 04/12/13 – IG 6 semanas e 6 dias
- C) DPP 04/11/13 – IG 6 semanas e 6 dias
- D) DPP 07/11/13 – IG 7 semanas e 2 dias

---

**QUESTÃO 37**

Sobre a Tuberculose analise as afirmativas abaixo:

- I - A identificação precoce da Tuberculose e o tratamento completo dos casos bacilíferos são considerados a melhor estratégia de prevenção por eliminarem os focos de infecção na comunidade interrompendo a cadeia de transmissão.
- II - A quimioprofilaxia primária no tratamento da Tuberculose é a profilaxia da doença em indivíduos infectados e a quimioprofilaxia secundária é a prevenção da infecção.
- III - A intolerância gástrica é o evento adverso mais frequente observado nas complicações do tratamento da Tuberculose, acrescenta-se ainda as dermatites e artralgias.
- IV - Falência Terapêutica é definida como resistência a três dos fármacos normatizados para o tratamento da Tuberculose. Já a Multiresistência é definida como a persistência da baciloscopia positiva no final do tratamento ou indivíduos que se mantêm fortemente positivos na baciloscopia até o 4º mês de tratamento.

Estão **CORRETAS**:

- A) I e III, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.

---

**QUESTÃO 38**

Podemos considerar exemplos de helmintos intestinais, **EXCETO**:

- A) Enterobius vermicularis
- B) Áscaris lumbricóides
- C) Balantidium coli
- D) Strongilóides estercoralis

---

**QUESTÃO 39**

Relacione as colunas abaixo.

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1) Hanseníase Virchowiana   | ( ) Apresenta manchas hipocrômicas e/ou eritematosas-hipocrômicas, com ou sem diminuição da sudorese e rarefação dos pelos. |
| 2) Hanseníase Dimorfa       | ( ) Apresenta lesões eritematosas planas com o centro claro (lesões pré-faveolares) e alteração de sensibilidade.           |
| 3) Hanseníase Tuberculóide  | ( ) Apresenta lesões eritematosas e infiltração difusa, placas eritematosas infiltradas e de bordas mal definidas.          |
| 4) Hanseníase Indeterminada | ( ) Apresenta lesões eritematosas, eritematosas-hipocrômicas bem delimitadas com comprometimento do nervo.                  |

Marque a opção **CORRETA**:

- A) 3, 4, 2, 1
- B) 1, 3, 2, 4
- C) 2, 3, 1, 4
- D) 4, 3, 1, 3

---

**QUESTÃO 40**

Segundo Brasil (2013), dentro da Estratificação de Risco Cardiovascular podemos considerar indicativo de Alto Risco, **EXCETO**:

- A) Acidente vascular cerebral prévio
- B) Diabetes Mellitus
- C) Hipertensão
- D) Nefropatias

---

**QUESTÃO 41**

A Assistência de Enfermagem para a pessoa com Diabetes Mellitus deve estar voltada para um processo de Educação em Saúde que auxilie o indivíduo a conviver melhor com a sua condição crônica.

As assertivas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- A) Tabagismo, mau controle glicêmico e deformidades nos pés são fatores de risco para úlceras nos pés em pacientes diabéticos.
- B) No exame físico do paciente diabético, a avaliação músculo-esquelética consiste na observação da higiene dos pés e corte das unhas, presença de bolhas, úlceras e áreas de eritema.
- C) O teste para o Reflexo de Aquileu realizado no paciente diabético é considerado alterado quando há ausência da flexão do pé.
- D) As insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2°C e 8°C e, após abertas, podem ser mantidas tanto em refrigeração entre 2°C e 8°C, quanto em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

---

**QUESTÃO 42**

A prática regular de atividade física é fundamental na adoção de hábitos de vida saudáveis e no controle da Diabetes Mellitus.

Analise as afirmativas abaixo:

- I - A atividade física diminui a sensibilidade muscular à insulina.
- II - O paciente diabético deve envolver a maior diversidade de grupos musculares, buscando melhora da circulação geral e assimilação da insulina.
- III - Os exercícios aeróbios intensos em pacientes diabéticos com retinopatia diminuem o risco de deslocamento de retina.
- IV - A albuminúria e as nefropatias não contra indicam a prática de atividade física.

Estão **CORRETAS**:

- A) I e II, apenas.
- B) II e IV, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I e III, apenas.

---

**QUESTÃO 43**

Considerando a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, marque (V) nas questões verdadeiras e (F) nas questões falsas:

- ( ) Os tumores são considerados a primeira causa de morte na população masculina.
- ( ) Estudos comparativos entre homens e mulheres tem comprovado que os homens são mais vulneráveis às doenças, sobretudo enfermidades graves e crônicas e que morrem mais precocemente do que as mulheres.
- ( ) As causas externas englobam uma série de agravos principalmente os acidentes, lesões autoprovocadas e as agressões.
- ( ) A presente política enfatiza a necessidade de mudanças de paradigma no que concerne à percepção da população masculina em relação ao cuidado com sua saúde e a saúde de sua família.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- A) V, F, V, F
- B) F, V, F, V
- C) F, V, V, V
- D) V, V, F, F

---

**QUESTÃO 44**

A prevalência de sobrepeso e obesidade cresceram de maneira importante nos últimos 30 anos, avalie as afirmativas abaixo:

- I - O Enfermeiro tem como atribuição na abordagem da obesidade a realização da promoção da saúde, orientando a alimentação saudável e a prevenção do excesso de peso.
- II - Usuários com obesidade tipo II sem resposta ao tratamento e usuários com obesidade tipo III devem ser referenciados para os serviços de alta complexidade.
- III - Usuários que apresentam sobrepeso associado a comorbidades ou usuários com obesidade tipo I ou obesidade tipo II devem ser assistidos por nutricionista em unidade de referência geográfica.
- IV - Os adultos e idosos tem valores de corte para sobrepeso de IMC > ou = 25 e para índices de obesidade IMC > ou = 30.

Estão **CORRETAS**:

- A) I e III, apenas.
- B) II e IV, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) III e IV, apenas.

---

**QUESTÃO 45**

A Hepatite viral é uma infecção sistêmica na qual as manifestações predominantes são decorrentes de doença hepática (DUNCAN, 2004). É **INCORRETO** afirmar:

- A) O período de viremia da Hepatite A varia de duas a quatro semanas, sendo sua penetração no organismo, em sua maioria, pela via oral-fecal.
- B) Há uma associação entre a presença do anti VHC e o carcinoma hepatocelular.
- C) O aleitamento materno não é contra-indicado em mães HbsAg positivas.
- D) Tanto a cronificação da Hepatite B, quanto a sua frequência, são diretamente proporcionais à idade.

---

**QUESTÃO 46**

Analisar as assertivas abaixo sobre rastreamento de tabagismo e abuso de álcool em adultos e marque (V) ou (F).

- ( ) A abordagem breve ao paciente tabagista pode levar a cerca de 5% de abandono do hábito de fumar.
- ( ) Há evidências que a cessação do tabagismo diminui risco de doença cardíaca, derrame e doenças pulmonares.
- ( ) O CAGE é um teste utilizado na atenção primária para rastreamento de abuso de álcool.
- ( ) A abordagem breve ao paciente tabagista associado a farmacoterapia oferecidos na atenção primária aumenta o sucesso do abandono do hábito de fumar com manutenção de abstinência por um ano.

Assinale a opção **CORRETA**:

- A) F, V, V, F
- B) V, V, V, V
- C) F, V, F, V
- D) F, V, F, F

---

**QUESTÃO 47**

Sobre a Dengue, leia as afirmativas abaixo e marque a opção correta:

- I - A dengue pode evoluir de forma assintomática ou como uma febre indiferenciada, podendo manifestar-se como dengue clássica, ou formas mais graves, como febre hemorrágica de Dengue.
- II - A dengue é uma doença de notificação compulsória.
- III - A possibilidade de agravamento do quadro clínico pode ser conhecida por sinais de alerta, além do aumento repentino de hematócrito e diminuição de plaquetas.
- IV - A prova do laço deve ser realizada na ausência do sangramento espontâneo.
- V - Entre o 3º e 7º dia de início da doença, quando ocorre a defervescência, podem surgir sinais de alarme que pronunciam evolução desfavorável da doença como vômitos, dor abdominal intensa e contínua, irritabilidade excessiva ou sonolência e diminuição de diurese.

Estão **CORRETAS**:

- A) I, II e IV, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) I, II, III, IV e V.

---

**QUESTÃO 48**

O escore de Framingham é uma ferramenta de estratificação do risco para doenças cardiovasculares. Sobre ele **NÃO** podemos afirmar:

- A) Risco intermediário - 10 a 20% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em dez anos.
- B) Alto risco – mais de 20% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em dez anos.
- C) A estratificação de risco de Framingham tem como objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer um evento cardiovascular durante sua vida.
- D) Se o usuário apresentar no exame clínico e/ou anamnese apenas um fator de alto risco cardiovascular não há necessidade de calcular o escore, pois esse paciente já é considerado como alto risco cardiovascular.

---

**QUESTÃO 49**

O processo normal de envelhecimento está associado a uma diminuição da acuidade visual devido à alterações fisiológicas das lentes oculares, déficit do campo visual e doenças da retina.

Para avaliação da acuidade visual em idosos, deve-se:

- A) Examinar todos os idosos com mais de 80 anos utilizando o cartão de Jaeger.
- B) Perguntar ao idoso sobre a dificuldade para ler, assistir à televisão, dirigir ou desenvolver as atividades de vida diária. Aqueles idosos que responderem afirmativamente, deverão ser examinados com o uso do cartão de Jaeger.
- C) Examinar o idoso que esteja com queixa de dificuldade de visão para perto utilizando a escala de Ramsay.
- D) Encaminhar para avaliação médica de acuidade visual todos os idosos.

---

**QUESTÃO 50**

Incontinência urinária é a perda de urina involuntária. Sobre incontinência urinária em idosos é **CORRETO** afirmar:

- A) Cerca de 80% dos idosos não institucionalizados apresenta incontinência urinária.
- B) Muitas das causas de incontinência urinária em idosos são causas irreversíveis como uso de medicamentos e infecções.
- C) Na avaliação de “Medida de Independência Funcional” do idoso não é possível avaliar a incontinência urinária.
- D) Na avaliação de incontinência urinária em idosos deve-se perguntar diretamente se a pessoa idosa perdeu urina recentemente ou sentiu-se molhada.

---

**QUESTÃO 51**

Todas as alternativas apresentam direitos do idoso de acordo com o Estatuto do idoso, **EXCETO**:

- A) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
- B) Ao idoso que não esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de recorrer primeiramente à equipe médica para a tomada de decisão em relação ao seu tratamento de saúde.
- C) É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- D) Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária.

---

**QUESTÃO 52**

Estudos demonstram que 09 em cada 10 indivíduos a partir de 55 anos provavelmente desenvolverão hipertensão arterial durante a sua vida tornando-se um dos maiores problemas de saúde pública.

Sobre Hipertensão Arterial em idosos é **CORRETO** afirmar:

- A) A hipertensão do jaleco branco não é comum em idosos.
- B) Reações adversas mais comuns de diuréticos diazídicos são tonturas, fadiga e alucinações.
- C) Nos idosos frágeis é indicado manter níveis pressóricos tendendo a uma leve hipertensão, cujo objetivo é evitar complicações agudas.
- D) A avaliação da hipotensão ortostática no idoso deve ser feita com o idoso na posição de decúbito lateral.

---

**QUESTÃO 53**

Segundo o Caderno de Atenção Básica “Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa” (BRASIL, 2006), são atribuições do Enfermeiro da Saúde da Família no atendimento à saúde da pessoa idosa, **EXCETO**:

- A) Preencher, entregar e atualizar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.
- B) Realizar assistência domiciliar, quando necessário.
- C) Realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto aos demais profissionais da equipe.
- D) Orientar o idoso, os familiares e/ou o cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos.

---

**QUESTÃO 54**

Com a idade avançada, ocorrem alterações intrínsecas e extrínsecas que afetam a função e o aspecto da pele.

São alterações tegumentares relacionadas ao envelhecimento, **EXCETO**:

- A) A epiderme e a derme se tornam mais delgadas.
- B) A pele torna-se mais oleosa e mais susceptível à infecções.
- C) O colágeno da pele se torna mais rígido.
- D) Redução da tolerância aos extremos de temperatura.

---

**INSTRUÇÃO:** A Portaria 3.088 de 23 de dezembro de 2011 institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Com base no disposto nessa Portaria responda as questões 55 e 56.

**QUESTÃO 55**

Leia os itens a seguir considerando a Portaria 3.088 de 23 de dezembro de 2011 em seu Art. 2º “Constituem-se diretrizes para o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial”:

- 1- Desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos.
- 2- Organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com estabelecimento de ações intrínsecas a esta rede para garantir a integralidade do cuidado.
- 3- Promoção de estratégias de educação permanente.
- 4- Desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, tendo como eixo central a prescrição de atividades territoriais em substituição à prática manicomial.

Podemos dizer que as afirmativas corretas, quanto ao Artigo citado, são sentenças expressas em:

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 2, 3 e 6, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.

---

**QUESTÃO 56**

Compõem como alguns dos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial nos componentes “Atenção Residencial de Caráter Transitório”, “Estratégias de Desinstitucionalização” e “Atenção Psicossocial Especializada”, respectivamente, os seguintes serviços:

- A) Serviço Residencial Terapêutico, Unidade de Acolhimento Adulto, Centro de Atenção Psicossocial;
- B) Comunidade Terapêutica, Programa de Volta Para Casa e Serviço Hospitalar de Referência;
- C) Unidade de Acolhimento, Programa de Volta Para Casa e Serviço Hospitalar de Referência;
- D) Unidade de Acolhimento Infante Juvenil, Serviço Residencial Terapêutico e Centro de Atenção Psicossocial.

## QUESTÃO 57

Em 2013 foi publicado o Caderno de atenção Básica nº 34 que trata das atividades em saúde mental nas equipes da Atenção Básica. Este caderno aponta ferramentas úteis para o trabalho com famílias que vivenciam situações conflituosas e afirma que a saúde da família vai muito além da soma da saúde dos seus indivíduos.

Considerando que um profissional da equipe de saúde da família identifique um conflito familiar que requeira abordar situações que envolvam aspectos multigeracionais ou transgeracionais para identificar as relações e ligações dentro do sistema multigeracional e em seguida precise fazer um estudo do funcionamento da família focando em suas relações de poder, comunicação e afeto, esse profissional deverá utilizar quais ferramentas?

- A) Ecomapa e P.R.A.C.T.I.C.E
- B) Projeto terapêutico de cuidado à família e Discussão e reflexão de casos clínicos
- C) Genograma e F.I.R.O
- D) Ecomapa e F.I.R.O

## QUESTÃO 58

“Há evidências sólidas que o sofrimento mental comum tem um impacto significativo em alguns dos mais prevalentes agravos à saúde. Seja como fator de risco, seja piorando a aderência ao tratamento, ou ainda piorando o prognóstico” (BRASIL 2013, p.93).

Considere a figura abaixo:

Quadro 1 – Associação entre problemas de saúde mental e outros agravos à saúde

	T. Mental é fator de risco	T. Mental piora aderência ao tratamento	T. Mental piora prognóstico
Doenças não infecciosas			
Depressão/ansiedade e doença coronariana	4	2	3
Depressão e AVC	3	0	3
Depressão/ansiedade e diabetes	1	3	3
Doenças infecciosas			
Dependência química e HIV/aids	2	3	3
Alcoolismo e tuberculose	2	3	3
Depressão/ansiedade e tuberculose	0	3	0
<b>Saúde materno-infantil</b>			
Depressão puerperal e déficit no desenvolvimento do bebê	3	0	0
Psicose puerperal e mortalidade infantil	4	ND	ND

**Legenda:** 4= associação forte confirmada por meta-análise ou revisão sistemática; 3= associação consistente confirmada por diversos estudos; 2= associação confirmada por um estudo; 1= associação inconsistente; 0= nenhuma associação confirmada; ND= dados inexistentes

Fonte: Adaptado a partir de Prince et al, 2007.

Analise as afirmações a seguir com base no exposto no quadro 1 acima:

- 1- A um profissional da atenção primária à saúde que se põe a cuidar de um paciente com quadro de AVC é indicado investigar por depressão como comorbidade uma vez que o tratamento desse transtorno favoreceria a adesão do paciente ao tratamento do AVC.
- 2- Pode-se afirmar que um quadro de depressão puerperal em uma mãe tem grande chance de interferir negativamente no desenvolvimento do seu bebê.
- 3- Pacientes com quadro de HIV/AIDS possuem melhor prognóstico de tratamento se forem tratados concomitantemente de dependência química caso esteja associada.
- 4- Considerando os estudos envolvidos na pesquisa que gerou esses dados não é possível afirmar que a psicose puerperal pode contribuir para a mortalidade infantil

Pode-se afirmar que:

- A) 1, 2 e 3 estão corretas, apenas.
- B) 2 e 3 estão corretas, apenas.
- C) 2, 3 e 4 estão corretas, apenas.
- D) 1 e 4 estão corretas, apenas.

---

**QUESTÃO 59**

A Lei 10.216, sancionada em 6 de abril de 2001, regula as internações psiquiátricas e promove mudanças no modelo assistencial aos pacientes portadores de sofrimento mental. A internação, um ponto em especial desta lei, tem sido alvo de muitas discussões diante do processo atual de abordagem de usuários de drogas.

Com base do disposto na Lei 10.216 de 2001 sobre o processo de internação psiquiátrica, marque a alternativa que apresenta uma afirmativa **CORRETA**:

- A) A internação compulsória é aquela determinada pelo juiz ou pelo Ministério Público.
- B) Não há possibilidade de uma internação voluntária se tornar involuntária no decorrer do período no qual o paciente esteja internado em uma instituição legalmente constituída.
- C) O término da internação involuntária só poderá ser determinado pelo especialista responsável pelo tratamento.
- D) A internação compulsória poderá ser voluntária ou involuntária.

---

**QUESTÃO 60**

Considerando as afirmativas sobre os impactos do sofrimento mental comum na saúde, marque (V) para afirmativas verdadeiras ou (F) para afirmativas falsas:

- ( ) A política Nacional de abordagem ao consumo de drogas tem a busca pela abstinência como ponto central e foca os seus esforços na perspectiva de cura em relação ao uso.
- ( ) A pessoa que hoje apresenta dependência de álcool já teve um longo percurso de uso e, durante esse período certamente teve algum contato com um profissional de saúde que poderia ter suscitado o risco da dependência se tivesse abordado a questão do uso.
- ( ) As vertentes históricas de entendimento de política de redução de danos ligadas a “HIV/DST em usuários de drogas” (COMTE et al., 2004) ou “concebida como conceito mais abrangente, no campo da Saúde Pública/Saúde Coletiva, por abarcar ações e políticas públicas voltadas para a prevenção dos danos antes que eles aconteçam” (DIAS et al., 2003) têm em comum tomar como fundamental a valorização do desejo e das possibilidades dos sujeitos para os quais estão orientadas essas ações.
- ( ) No campo do álcool e outras drogas, o paradigma da redução de danos se situa como estratégia de saúde pública que visa a reduzir os danos causados apenas pelo abuso de drogas ilícitas uma vez que as drogas lícitas possuem regulação própria pelo profissional que a prescreve e/ou pela ANVISA.

Como seqüência **CORRETA** temos:

- A) F – V – V – F
- B) V – F – F – F
- C) F – V – V – V
- D) V – F – F – V